ANAIS - XXII FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, III FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO E II FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO MÉDIO.
n.1 (2015)

DIETA DE Cerdocyon thous (CACHORRO-DO-MATO) E SUA ESTRATÉGIA PARA SIMPATRIA COM Chrysocyon brachyurus (LOBO-GUARÁ) EM UMA PAISAGEM SILVICULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Autores: GILLI, L.C.; GHELER-COSTA, C.
Tipo de Pesquisa: Iniciação Científica Voluntária
Agência de Fomento: Não se aplica
Área de Conhecimento: Saúde – Ciências Biológicas
Instituição de Origem: USC

O cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) foi a primeira espécie de canídeo relatada na literatura, possuindo uma ampla distribuição geográfica. É uma espécie onívora, possuindo uma dieta generalista podendo ser composta por pequenos mamíferos roedores, plantas, frutos e insetos. O lobo-guará assim como o cachorro-do-mato, é uma espécie onívora, possuindo uma dieta generalista e composta de pequenos mamíferos, insetos, e principalmente o fruto da lobeira (Solanum lycocarpum). Ocorre em áreas de cerrado e campos sulinos e é considerado o maior canídeo encontrado em regiões neotropicais. Apesar de possuir fácil adaptação, a drástica redução e fragmentação de habitats, especialmente nas transformações de áreas naturais em lavouras, são as principais ameaças para essas populações. Considerando-se esses problemas, o presente trabalho teve como objetivo analisar a composição da dieta de Cerdocyon thous em uma área antropizada, bem como seu papel como agente predador e/ou dispersor de sementes. As amostras fecais foram coletadas ao longo de trilhas e posteriormente triadas a olho nu separando os objetos por categorias como pelos, penas, ossos, entre outros. Todas as amostras foram fotografadas em campo e armazenadas sob refrigeração. Foram coletadas apenas 09 amostras fecais de Cerdocyon thous, e 28 amostras fecais de Chrysocyon brachyurus (lobo-guará). As duas espécies de canideos analisadas embora possuam tamanhos corporais diferentes, ocupam o mesmo ambiente e demonstram a mesma estratégia de forrageamento, no entanto partilham poucas presas, ou seja, cada espécie

a seu modo consome presas diferentes e em diferentes proporções. A amplitude de nicho para C. Thous foi de 0,227 e de C. brachyurus foi de 0,369.

Palavras-chave: Cachorro-do-mato. Lobo-Guará. Dieta. Canídeo.